

Ert barn har genomgått tandvård som gjorts i anestesi. Nedanstående information är viktig att följa så att vårdresultatet inte äventyras och för att eftervården hemma skall kännas trygg.

Återhämtning

Anestesimedicinerna som används är kortverkande, och uppvakningen sker rätt snabbt efter att ingreppet är över. Återhämtningen är dock individuell. Illamående är ovanligt, men kan förekomma. Följande anvisningar bör följas:

- barnet bör vila resten av dagen efter ingreppet
- livliga lekar bör undvikas
- ifall illamående uppstår, bör barnet vila och kan dricka små mängder vätska. Isglass eller glass är bra att ha hemma ifall barnet vill ha
- varm mat bör undvikas eftersom munnen kan vara bedövad ännu flera timmar efter ingreppet
- låt barnet sova ifred ifall barnet verkar trött
- följande dag kan barnet gå till skolan eller dagis
- svalget kan vara sjukt och ömt ett par dagar efter ingreppet, detta beror på en andningstub som varit i halsen under ingreppet

Tandfyllningar (Plomber)

Barnet får äta och dricka genast när anestesimedicinernas verkan upphört. Tandköttet kan vara ömt till en början, men detta går över. De lappade tänderna kan ila, men det avtar så småningom då plomben satt sig ordentligt i tanden.

Amputering av mjölktdandsroten (pulpotomi)

Detta ingrepp motsvarar rotbehandling av en permanent tand, men det görs på en mjölkttand. Ilande och ömhet i tanden kan förekomma längre än vid en vanlig lappning. Barnet får äta och dricka genast när anestesimedicinernas verkan upphört.

Utdragning av tand

Efter att man dragit ut en tand och bedövningen upphört kan barnet ha ont där tanden suttit. Gropen där tanden suttit kan blöda ett par dagar efter ingreppet. För att tandköttet skall få läka ifred bör barnet inte äta eller dricka något två timmar efter ingreppet. Varm mat skall undvikas eftersom munnen kan vara bedövad ännu ett par timmar efter ingreppet. Ifall gropen där tanden suttit börjar blöda kan man stilla blodflödet med en isbit eller isglass. Barnet bör undvika att svälja blod eftersom det kan orsaka illamående. Bastubad bör undvikas ett par dagar efter man dragit ut en tand, därför att blödning ur gropen där tanden suttit kan öka. Ett par dagar efter ingreppet, tills det att blödningen upphört, skall barnet undvika att dricka med sugrör och gurgla.

Ge barnet receptfria smärtstillande läkemedel som finns att köpa på apoteket. T. ex paracetamol (Panadol, Para-Tabs) eller ibuprofen (Burana, Ibusal). Följ doseringsanvisningarna som står på förpackningen. Det lönar sig att ge barnet smärtstillande medicin regelbundet 2-3 dagar efter ingreppet.

Ifall Ni har frågor angående återhämtningen efter anestesin eller om smärtstillande, ta kontakt med er anestesijötare.

telefon: